

第2章 調査の結果

調査結果について説明する。各質問の性・年代別の単純集計は以下のようにになっている。各選択肢を選んだ割合(%)を表示している。

(1)質問 1

表2.1 質問1の性・年代別集計(2000年8月調査)

質問1(8月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	その他わからない		
男	20歳代	69	87.0	2.9	8.7	0.0	1.4
	30歳代	66	90.9	0.0	6.1	0.0	3.0
	40歳代	96	93.8	0.0	3.1	0.0	3.1
	50歳代	153	96.7	0.7	2.6	0.0	0.0
	60歳以上	219	98.6	0.0	0.9	0.0	0.5
	全年齢	603	95.2	0.5	3.2	0.0	1.2
	女	20歳代	77	96.1	1.3	2.6	0.0
30歳代		130	97.7	0.8	0.8	0.0	0.8
40歳代		166	99.4	0.0	0.6	0.0	0.0
50歳代		164	99.4	0.0	0.0	0.0	0.6
60歳以上		273	98.2	0.0	0.7	0.0	1.1
全年齢		810	98.4	0.2	0.7	0.0	0.6
全体		1413	97.0	0.4	1.8	0.0	0.8

(ア)どのような理由であれ、絶対に使うべきでないし、許されることではない
(イ)心や体への害がないなら、1回くらい使ってもかまわない
(ウ)他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由である

表2.2 質問1の性・年代別集計(2000年9月調査)

質問1(9月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	その他わからない		
男	20歳代	89	91.0	0.0	6.7	0.0	2.2
	30歳代	86	93.0	0.0	5.8	1.2	0.0
	40歳代	112	95.5	1.8	0.9	0.0	1.8
	50歳代	142	93.7	1.4	2.1	0.0	2.8
	60歳以上	248	96.8	0.4	0.8	0.0	2.0
	全年齢	677	94.7	0.7	2.5	0.1	1.9
	女	20歳代	86	95.3	3.5	1.2	0.0
30歳代		131	95.4	0.8	0.8	0.8	2.3
40歳代		125	98.4	0.8	0.0	0.0	0.8
50歳代		165	98.8	0.6	0.6	0.0	0.0
60歳以上		248	98.0	0.0	0.0	0.0	2.0
全年齢		755	97.5	0.8	0.4	0.1	1.2
全体		1432	96.2	0.8	1.4	0.1	1.5




(ア)どのような理由であれ、絶対に使うべきでないし、許されることではない
(イ)心や体への害がないなら、1回くらい使ってもかまわない
(ウ)他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由である

表2.3 質問1の性・年代別集計(2000年12月調査)

質問1(12月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	その他わからない		
男	20歳代	67	88.1	0.0	11.9	0.0	0.0
	30歳代	83	97.6	0.0	1.2	0.0	1.2
	40歳代	84	97.6	1.2	0.0	0.0	1.2
	50歳代	137	97.1	0.7	2.2	0.0	0.0
	60歳以上	250	96.0	0.8	0.0	0.0	3.2
	全年齢	621	95.8	0.6	1.9	0.0	1.6
女	20歳代	94	94.7	3.2	0.0	0.0	2.1
	30歳代	102	98.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	40歳代	128	98.4	0.0	0.8	0.0	0.8
	50歳代	164	99.4	0.0	0.6	0.0	0.0
	60歳以上	267	98.5	0.4	0.0	0.0	1.1
	全年齢	755	98.1	0.5	0.5	0.0	0.8
全体	1376	97.1	0.6	1.2	0.0	1.2	

(ア)どのような理由であれ、絶対に使うべきでないし、許されることではない
(イ)心や体への害がないなら、1回くらい使ってもかまわない
(ウ)他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由である

質問1は覚せい剤についての意識を問うための質問である。3回の調査を通して共通に言えることは男性の20歳代、30歳代に使用を容認する考えを持つ者が多いことである。特に12月調査における男・20歳代では11.9%が「他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由である」と答えている。8月、9月も8.7%、6.7%いることが分かっている。昨年度の調査での20歳代男性で「他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由である」と答えた割合は、8月、9月、12月で順に9.0%、6.3%、2.5%であった。本年度は、この結果と比べてもさらに多く、若い層での覚せい剤に対する認識が、他の世代と異なっており、その差が増大しつつあることを物語っているのかもしれない。次ページの帯グラフは、各調査での20歳代、30歳代と全年齢の回答パターンの差違を示すためのものである。



(2)質問 2

表3.1 質問2の性・年代別集計(2000年8月調査)

質問2(8月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	69	94.2	2.9	0.0	1.4	1.4
	30歳代	66	97.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	96	96.9	0.0	0.0	0.0	3.1
	50歳代	153	98.7	1.3	0.0	0.0	0.0
	60歳以上	219	98.2	0.9	0.0	0.0	0.9
	全年齢	603	97.5	1.3	0.0	0.2	1.0
女	20歳代	77	98.7	1.3	0.0	0.0	0.0
	30歳代	130	99.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	40歳代	166	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	164	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳以上	273	98.9	0.0	0.0	0.0	1.1
	全年齢	810	99.4	0.2	0.0	0.0	0.4
全体		1413	98.6	0.7	0.0	0.1	0.6
(ア)絶対に使用しない (イ)ばれなければ1回くらいは使用してみたい (ウ)誰に迷惑をかける訳でもないので常習的に使用してみたい							

表3.2 質問2の性・年代別集計(2000年9月調査)

質問2(9月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	89	97.8	2.2	0.0	0.0	0.0
	30歳代	86	96.5	2.3	0.0	0.0	1.2
	40歳代	112	93.8	4.5	0.0	0.9	0.9
	50歳代	142	95.1	1.4	0.7	0.0	2.8
	60歳以上	248	98.4	0.4	0.0	0.8	0.4
	全年齢	677	96.6	1.8	0.1	0.4	1.0
女	20歳代	86	97.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	30歳代	131	97.7	0.8	0.0	0.8	0.8
	40歳代	125	99.2	0.0	0.0	0.0	0.8
	50歳代	165	98.8	0.6	0.0	0.6	0.0
	60歳以上	248	98.4	0.0	0.0	0.0	1.6
	全年齢	755	98.4	0.5	0.0	0.3	0.8
全体		1432	97.6	1.1	0.1	0.3	0.9
(ア)絶対に使用しない (イ)ばれなければ1回くらいは使用してみたい (ウ)誰に迷惑をかける訳でもないので常習的に使用してみたい							

表3.3 質問2の性・年代別集計(2000年12月調査)

質問2(12月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくない	わからない
男	20歳代	67	97.0	3.0	0.0	0.0
	30歳代	83	95.2	2.4	1.2	1.2
	40歳代	84	97.6	1.2	0.0	0.0
	50歳代	137	97.8	2.2	0.0	0.0
	60歳以上	250	96.8	0.8	0.0	0.0
	全年齢	621	96.9	1.6	0.2	0.2
女	20歳代	94	95.7	2.1	0.0	0.0
	30歳代	102	100.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	128	98.4	1.6	0.0	0.0
	50歳代	164	99.4	0.6	0.0	0.0
	60歳以上	267	99.3	0.0	0.0	0.0
	全年齢	755	98.8	0.7	0.0	0.0
全体	1376	98.0	1.1	0.1	0.1	0.8

(ア)絶対に使用しない
(イ)ばれなければ1回くらいは使用してみたい
(ウ)誰に迷惑をかける訳でもないので常習的に使用してみたい

質問2では覚せい剤を使用する可能性について問うている。3回の調査を通して共通に言えることは、さすがに「常習的に使用してみたい」と答える者はほとんどいないが、女性と比べて男性の方に「1回くらいは使用してみたい」と答える割合が多いことである。平成11年度調査でも同様の傾向を持っていた。平成11年度と同様に、質問1との関連を知るために9月調査についてクロス集計を行った。

表4.1 質問1と質問2とのクロス集計(1999年9月調査)

	総数	質問1				
		(ア)	(イ)	(ウ)	その他わからない	
質問2 (ア)	1397	98.0	0.6	0.9	0.1	0.3
(イ)	15	46.7	33.3	20.0	0.0	0.0
(ウ)	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
答えたくない	5	20.0	0.0	0.0	20.0	60.0
わからない	8	50.0	12.5	12.5	0.0	25.0

表4.2 質問1と質問2とのクロス集計(2000年9月調査)

	総数	質問1				
		(ア)	(イ)	(ウ)	その他わからない	
質問2 (ア)	1397	97.6	0.6	1.2	0.0	0.6
(イ)	16	68.8	12.5	18.8	0.0	0.0
(ウ)	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
答えたくない	5	40.0	0.0	0.0	20.0	40.0
わからない	13	7.7	0.0	0.0	7.7	84.6

質問2で「ばれなければ1回くらいは使用してみたい」と答えた中で、質問1では「心や体への外がないなら、1回くらいは使ってもかまわない」と答えた者は平成11年度では

15人中、5人、平成12年度では16人中、2人であった。また、質問1では「他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由である」と答えた者は平成11年度では15人中、3人、平成12年度では16人中、3人であった。覚せい剤に対する危険意識の無い者の方が使用の機会が訪れたときに使用してしまう危険が多いことを示唆している。

(3)質問3

表5.1 質問3の性・年代別集計(2000年8月調査)

質問3(8月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくないわからない		
男	20歳代	69	87.0	5.8	5.8	1.4	0.0
	30歳代	66	90.9	6.1	0.0	3.0	0.0
	40歳代	96	96.9	3.1	0.0	0.0	0.0
	50歳代	153	98.0	0.7	1.3	0.0	0.0
	60歳以上	219	97.3	0.9	1.4	0.5	0.5
	全年齢	603	95.5	2.3	1.5	0.7	0.2
女	20歳代	77	96.1	0.0	3.9	0.0	0.0
	30歳代	130	96.9	0.0	2.3	0.0	0.8
	40歳代	166	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	164	99.4	0.0	0.6	0.0	0.0
	60歳以上	273	98.2	0.7	0.4	0.0	0.7
	全年齢	810	98.4	0.2	1.0	0.0	0.4
全体	1413	97.2	1.1	1.2	0.3	0.3	
(ア)誘われたり、勧められたことはない (イ)購入を勧められたことがある (ウ)使用を誘われたことがある							

表5.2 質問3の性・年代別集計(2000年9月調査)

質問3(9月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくないわからない		
男	20歳代	89	89.9	4.5	4.5	0.0	2.2
	30歳代	86	93.0	4.7	2.3	1.2	0.0
	40歳代	112	95.5	1.8	2.7	0.0	0.0
	50歳代	142	98.6	0.7	0.7	0.0	0.0
	60歳以上	248	96.4	1.2	1.2	1.2	0.0
	全年齢	677	95.4	2.1	1.9	0.6	0.3
女	20歳代	86	95.3	0.0	3.5	0.0	1.2
	30歳代	131	97.7	0.8	0.0	0.8	0.8
	40歳代	125	99.2	0.0	0.8	0.0	0.0
	50歳代	165	97.6	0.6	1.2	0.0	0.6
	60歳以上	248	99.2	0.0	0.0	0.0	0.8
	全年齢	755	98.1	0.3	0.8	0.1	0.7
全体	1432	96.9	1.1	1.3	0.3	0.5	
(ア)誘われたり、勧められたことはない (イ)購入を勧められたことがある (ウ)使用を誘われたことがある							

表5.3 質問3の性・年代別集計(2000年12月調査)

質問3(12月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	67	95.5	3.0	1.5	0.0	0.0
	30歳代	83	91.6	6.0	2.4	1.2	0.0
	40歳代	84	95.2	3.6	0.0	0.0	1.2
	50歳代	137	97.8	0.7	1.5	0.0	0.0
	60歳以上	250	96.4	1.6	0.8	0.0	1.6
	全年齢	621	95.8	2.4	1.1	0.2	0.8
女	20歳代	94	95.7	1.1	1.1	0.0	2.1
	30歳代	102	98.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	40歳代	128	99.2	0.0	0.8	0.0	0.0
	50歳代	164	99.4	0.0	0.6	0.0	0.0
	60歳以上	267	98.5	0.4	0.0	0.0	1.1
	全年齢	755	98.4	0.4	0.5	0.0	0.7
全体		1376	97.2	1.3	0.8	0.1	0.7
(ア)誘われたり、勧められたことはない (イ)購入を勧められたことがある (ウ)使用を誘われたことがある							

質問 3 は覚せい剤使用あるいは購入の誘いについての問である。すなわち、覚せい剤に近づく可能性がどの程度有るかを調べている。3回の調査を通して共通に言えることは、女性と比べて男性の方が誘われた経験を持つ者の割合が多いことである。また、20歳代、30歳代が多い。これらは、平成11年度調査と同様であるが、男性40歳代で「購入を勧められたことがある」と答えた者の割合が平成12年度は増加していることが気にかかることである。

表6.1 購入あるいは使用を誘われた回数(2000年9月調査)

		該当者	1回	2回	3回	4回	5回以上	答えたくないわからない	
男	20歳代	7	14.3	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
	30歳代	5	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
	40歳代	5	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	40.0
	50歳代	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	60歳以上	6	66.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7
	全年齢	25	28.0	24.0	8.0	0.0	16.0	4.0	20.0
女	20歳代	3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0
	30歳代	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳以上	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全年齢	8	25.0	25.0	37.5	0.0	0.0	12.5	0.0
全体		33	27.3	24.2	15.2	0.0	12.1	6.1	15.2

上の表は2000年9月調査で「購入を勧められたことがある」あるいは「使用を誘われたことがある」と答えた計32名の誘われた回数の分布である。5回以上が4名で12.1%いることがわかる。複数回誘われた経験を持つ者は17名で約52%である。誘うような人が近くに

いるか、誘われるような場所に繰り返し行っている可能性が高い。この傾向も平成 11 年度と同様である。

表6.2 購入あるいは使用を誘われた場所(2000年9月調査)

	該当者	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
最近	26	15.4	15.4	3.8	26.9	7.7	0	30.7
二番目	17	11.8	17.6	5.9	29.4	5.9	5.9	23.6
三番目	9	22.2	11.1	0	55.6	0	0	11.1
延べ	52	15.4	15.4	3.8	32.7	5.8	1.9	25

(ア) 繁華街(路上)で購入を勧められた
(イ) 飲食店で購入を勧められた
(ウ) ディスコで購入を勧められた
(エ) 知人・友人の家で使用を誘われた
(オ) 飲食店で使用を誘われた
(カ) ディスコで使用を誘われた
(キ) その他・答えたくない・分からない

上の表は購入を勧められたり、使用を誘われた経験を有する者に直近 3 回の経験について、勧められたり、誘われた場所の内訳である。筆者の感覚ではディスコが意外と少ないように思う。知人・友人の家が最も多いのは、最近のマスメディアの報道を見聞きする限り、納得してしまうような結果である。この傾向も平成 11 年度と同様である。

表6.3 購入あるいは使用を誘われた相手(2000年9月調査)

	該当者	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)
最近	26	57.7	7.7	19.2	0	7.7	7.6
二番目	17	52.9	0	11.8	5.9	5.9	23.5
三番目	9	66.7	0	11.1	11.1	0	11.1
延べ	52	57.7	3.9	15.4	3.9	5.8	13.4

(ア) 友人・知人
(イ) 飲食店やディスコの従業員
(ウ) 外国人
(エ) 日本人(暴力団風)
(オ) 日本人(暴力団以外)
(カ) その他・答えたくない・分からない

延べで言うと 30 回が友人・知人、8 回が外国人、2 回が日本人(暴力団風)になっている。やはり友は選ぶべきなのかもしれない。平成 11 年度は、友人・知人 42.8%(18 回)、外国人 23.8%(10 回)、日本人(暴力団風) 19.1%(8 回)であった。友人・知人が大幅に増え、日本人(暴力団風)が大幅に減っていることが分かる。

(4)質問 4

表7.1 質問4の性・年代別集計(2000年8月調査)

質問4(8月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	69	5.8	11.6	79.7	1.4	1.4
	30歳代	66	1.5	9.1	83.3	1.5	4.5
	40歳代	96	3.1	10.4	78.1	0.0	8.3
	50歳代	153	5.2	8.5	83.7	0.0	2.6
	60歳以上	219	0.5	6.8	85.4	0.5	6.8
	全年齢	603	2.8	8.6	82.9	0.5	5.1
女	20歳代	77	2.6	14.3	81.8	0.0	1.3
	30歳代	130	2.3	13.1	83.1	0.0	1.5
	40歳代	166	0.6	7.8	90.4	0.0	1.2
	50歳代	164	1.8	7.3	86.6	0.0	4.3
	60歳以上	273	1.1	6.6	83.2	0.4	8.8
	全年齢	810	1.5	8.8	85.2	0.1	4.4
全体		1413	2.1	8.7	84.2	0.3	4.7

(ア)使用している人を知っている
(イ)具体例は知らないが、少しはいると思う
(ウ)いない

表7.2 質問4の性・年代別集計(2000年9月調査)

質問4(9月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	89	7.9	11.2	77.5	0.0	3.4
	30歳代	86	4.7	16.3	72.1	0.0	7.0
	40歳代	112	4.5	11.6	79.5	0.0	4.5
	50歳代	142	1.4	12.0	73.9	0.7	12.0
	60歳以上	248	0.4	4.0	87.5	0.4	7.7
	全年齢	677	2.8	9.5	80.1	0.3	7.4
女	20歳代	86	3.5	9.3	84.9	0.0	2.3
	30歳代	131	1.5	11.5	83.2	0.0	3.8
	40歳代	125	1.6	8.8	83.2	0.0	6.4
	50歳代	165	0.6	7.9	86.1	0.0	5.5
	60歳以上	248	0.8	2.4	89.9	0.0	6.9
	全年齢	755	1.3	7.0	86.2	0.0	5.4
全体		1432	2.0	8.2	83.3	0.1	6.4


(ア)使用している人を知っている
(イ)具体例は知らないが、少しはいると思う
(ウ)いない

表7.3 質問4の性・年代別集計(2000年12月調査)

質問4(12月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくない	わからない
男	20歳代	67	7.5	14.9	73.1	1.5	3.0
	30歳代	83	3.6	18.1	75.9	1.2	1.2
	40歳代	84	4.8	15.5	75.0	1.2	3.6
	50歳代	137	1.5	10.2	83.9	0.7	3.6
	60歳以上	250	1.2	7.6	82.8	0.0	8.4
	全年齢	621	2.7	11.4	80.0	0.6	5.2
女	20歳代	94	7.4	8.5	78.7	0.0	5.3
	30歳代	102	1.0	9.8	84.3	0.0	4.9
	40歳代	128	2.3	10.9	78.1	0.8	7.8
	50歳代	164	1.8	4.9	90.9	0.0	2.4
	60歳以上	267	1.5	3.0	89.1	0.4	6.0
	全年齢	755	2.4	6.4	85.7	0.3	5.3
全体		1376	2.5	8.6	83.1	0.4	5.2

(ア)使用している人を知っている
(イ)具体例は知らないが、少しはいると思う
(ウ)いない

質問4は覚せい剤を使用している知人の有無についての質問である。男女とも3回の調査結果は、ほぼ安定していたものと言える。



12月調査の女性の結果がやや大きめであるが、統計的なゆらぎの範囲にあるものと思われる。

表8.1 知っている乱用者の性・年齢・使用頻度について(2000年8月調査)

性別	回答者 年齢	知っている乱用者の性・年齢及び使用頻度						
		人数	最近		二番目		三番目	
			性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度
男	20歳代	2	3	3	2	4		
男	20歳代	3	3	2	3	2	3	2
男	20歳代	1	4	6				
男	20歳代	3	3	6	3	6	3	6
男	30歳代	1	3	6				
男	40歳代	2	3	2	12	6		
男	40歳代	2	3	4	3	4		
男	40歳代	1	4	6				
男	50歳代	1	4	5				
男	50歳代	3	4	2	4	2	5	4
男	50歳代	1	4	6				
男	50歳代	3	3	3	3	4	3	4
男	50歳代	1	4	3				
男	50歳代	3	9	2	3	3	2	2
男	50歳代	2	4	3	4	3		
男	50歳代	1	3	4				
男	60歳代	2	3	2	3	3		
女	20歳代	1	3	6				
女	20歳代	4	3	1	3	1	9	1
女	30歳代	1	8	6				
女	30歳代	1	4	1				
女	30歳代	2	4	3	3	3		
女	40歳代	1	2	6				
女	50歳代	3	4	4	3	1	3	1
女	50歳代	1	3	6				
女	50歳代	3	4	3	3	3	4	3
女	60歳代	9	4	6	4	6	4	6
女	60歳代	3	4	6	9	6	9	6
女	70歳代	1	3	1				

表8.2 知っている乱用者の性・年齢・使用頻度について(2000年9月調査)

回答者 性別 年齢		知っている乱用者の性・年齢及び使用頻度						
		人数	最近		二番目		三番目	
	性年齢		時期頻度	性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度	
男	20歳代	1	3	4				
男	20歳代	1	3	6				
男	20歳代	2	3	4	3	4		
男	20歳代	1	3	6				
男	20歳代	5	3	6	3	6	3	6
男	20歳代	5	2	3	3	2	3	4
男	20歳代	2	3	4	3	4		
男	30歳代	2	3	6	3	6		
男	30歳代	99						
男	30歳代	5	3	1	4	1	8	1
男	30歳代	1	3	6				
男	40歳代	2	3	6	4	6		
男	40歳代	3	4	1	4	1	4	1
男	40歳代	9	4	3	3	3	8	3
男	40歳代	2	4	4	4	4		
男	40歳代	1	3	6				
男	50歳代	3	4	6	4	6	4	6
男	50歳代	1	4	4				
男	60歳代	99						
女	20歳代	2	2	2	2	6		
女	20歳代	3	3	6	8	6	12	6
女	20歳代	2	2	4	7	4		
女	30歳代	88						
女	30歳代	2	3	1	3	1		
女	40歳代	99						
女	40歳代	1	2	2				
女	50歳代	1	4	3				
女	60歳代	6	3	6	3	6	1	1

表8.3 知っている乱用者の性・年齢・使用頻度について(2000年12月調査)

性別	回答者 年齢	知っている乱用者の性・年齢及び使用頻度						
		人数	最近		二番目		三番目	
			性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度
男	20歳代	3	2	2	3	2	7	2
男	20歳代	5	8	3	3	1	1	2
男	20歳代	5	3	3	3	3	3	3
男	20歳代	2	8	4	3	4		
男	20歳代	1	3	6				
男	30歳代	3	8	1	1	3	3	3
男	30歳代	9	3	1	8	1	4	1
男	30歳代	3	3	1	2	1	2	1
男	40歳代	1	3	6				
男	40歳代	1	4	6				
男	40歳代	2	4	6	4	6		
男	40歳代	2	4	3	4	3		
男	50歳代	1	3	2				
男	50歳代	2	9	2	4	2		
男	50歳代	2	4	1	4	3		
男	60歳代	2	4	1				
男	60歳代	3	2	1	1	6	12	6
男	70歳代	1	3	3				
女	20歳代	2	3	4	8	4		
女	20歳代	3	3	1	2	1	2	1
女	20歳代	2	3	3	3	3		
女	20歳代	2	3	3	8	4		
女	20歳代	1	3	6				
女	20歳代	1	2	3				
女	20歳代	1	3	3				
女	30歳代	88						
女	40歳代	2	4	2	4	6		
女	40歳代	3	1	6	1	6	1	6
女	40歳代	1	4	4				
女	50歳代	1	4	4				
女	50歳代	3	4	5	3	5	4	5
女	50歳代	1	3	6				
女	60歳代	3	7	3	7	3	7	3
女	60歳代	3	2	3	2	1	2	1
女	60歳代	1	3	1				
女	60歳代	1	4	3				