

第3章 オムニバス調査

調査票及び集計結果（表 16 から表 24）を示す。表の目的、見方等について説明する。

- ・ 表 16 オムニバス Q1 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 17 オムニバス Q2 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 18 オムニバス Q3 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 19 オムニバス Q3-SQ2(6)覚せい剤(ア)1年未満集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 20 オムニバス Q3-SQ2(6)覚せい剤(イ)1年以上集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 21 オムニバス Q3-SQ2(1)シンナー(ア)1年未満集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 22 オムニバス Q3-SQ2(1)シンナー(イ)1年以上集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 23 オムニバス Q4 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 24 オムニバス Q3-SQ2 の薬物ごとの乱用者数集計結果（総数のみ）

次に、薬物の乱用についておうかがいします。

Q 1. [回答票 10] あなたは、陶酔感などを得る目的で有機溶剤などを使用する、いわゆる「シンナー遊び」や、大麻*、MDMA*、コカイン、向精神薬、覚せい剤*、ヘロインの薬物を乱用することについてどのように考えますか。あなたの考えにあてはまるものをこの中から1つだけ選んでください。


- 1 (ア) どのような理由であれ、絶対に乱用すべきでないし、許されることではない
- 2 (イ) 心や体への害がないなら、1回くらい使ってもかまわない
- 3 (ウ) 他人に迷惑をかけていないので、乱用するかどうかは個人の自由である
- 4 その他 ()
- 5 わからない

⑳

Q 2. [回答票 11] あなたは、シンナーなどの有機溶剤、大麻、MDMA、コカイン、向精神薬、覚せい剤、ヘロインの薬物を乱用することや違法に購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。この中から、あなたの体験にあてはまるものをすべて選んでください。(M.A.)

	1	2	3	4	5
	(ア)	(イ)			
らない	購入をすすめられた ことがある	乱用を誘われた ことがある	誘われたり、すすめ られたことはない	答えたく ない	わか

Q 3. あなたは、あなたの周囲でシンナーなどの有機溶剤、大麻、MDMA、コカイン、向精神薬、覚せい剤、ヘロインの薬物を乱用している人を知っていますか。



S Q 1. あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 人	1 答えたくない 2 わからない
	} → (Q 4～)

S Q 2. 【回答票 12】では、使用薬物、使用時期ごとに薬物使用者の人数をお答えください。

(1)シンナー等の有機溶剤について、(ア) 1年未満では何人ですか。(イ) 1年以上前では何人ですか。【調査員注：(2)～(7)も同様に聞く】

	(ア) 1年未満	(イ) 1年以上前	
(1)シンナーなどの有機溶剤	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...
(2)大 麻	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...
(3)MDMA	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...
(4)コカイン	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...
(5)向精神薬	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...
(6)覚せい剤	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...
(7)ヘロイン	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> 人	...

【全員に】

Q 4. 【回答票 13】あなたは、いままでに、一度でもシンナーなどの有機溶剤、大麻、MDMA、コカイン、向精神薬、覚せい剤、ヘロインの薬物を乱用してみたいと思っただけことがありますか。この中から、あてはまるものを1つ選んでください。

- | | |
|-----------------|----------|
| 1 (ア) 最近1年未満にある | 4 答えたくない |
| 2 (イ) 1年以上前にある | 5 わからない |
| 3 (ウ) 思ったことはない | |

表16 オムニバスQ1. 薬物乱用に対する考え【性・年代別】

総数	どのような理由であれ、絶対に使うべきでないし、許されることではない	心や体への害がないから、1回くらい使ってもまわらない	他人に迷惑をかけたのではないので、使うかどうかは個人の自由である	その他	わからない
総数	1419	1373	12	13	1
男	614	589	7	8	1
20歳代	76	66	6	3	0
30歳代	117	109	0	3	0
40歳代	78	76	0	1	1
50歳代	119	119	0	0	0
60歳以上	224	219	1	1	0
女	805	784	5	5	0
20歳代	112	104	3	1	0
30歳代	136	134	1	1	0
40歳代	128	128	0	0	0
50歳代	192	189	0	0	0
60歳以上	237	229	1	3	0

表17 オムニバスQ2. 薬物の乱用・購入の勧誘の有無【性・年代別】

総数	購入をすすめられたこと	乱用を誘われたこと	乱用を誘われたことがあ誘われたり、すすめられ	答えたくない	わからない
総数	1419	31	27	1356	3
男	614	19	18	572	3
20歳代	76	5	5	64	1
30歳代	117	2	7	107	0
40歳代	78	4	4	70	1
50歳代	119	4	0	115	0
60歳以上	224	4	2	216	1
女	805	12	9	784	0
20歳代	112	3	5	104	0
30歳代	136	2	3	132	0
40歳代	128	2	1	125	0
50歳代	192	3	0	188	0
60歳以上	237	2	0	235	0

表18 オムニバスQ3. 薬物を使用している知人の有無【性・年代別】

	総数	使用している 人を知ってい	知らない	答えたくない	わからない
総数	1419	49	1342	10	18
男	614	24	578	5	7
20歳代	76	4	68	2	2
30歳代	117	7	108	0	2
40歳代	78	7	70	1	0
50歳代	119	2	117	0	0
60歳以上	224	4	215	2	3
女	805	25	764	5	11
20歳代	112	6	101	1	4
30歳代	136	5	126	2	3
40歳代	128	4	123	1	0
50歳代	192	4	186	0	2
60歳以上	237	6	228	1	2

表19 オムニバスQ3-SQ2. (6)覚せい剤(ア)1年未満【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	49	43	0	0	1	0	0	2	3	0
男	24	19	0	0	0	0	0	2	3	0
20歳代	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0
30歳代	7	5	0	0	0	0	0	1	1	0
40歳代	7	6	0	0	0	0	0	1	0	0
50歳代	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60歳以上	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0
女	25	24	0	0	1	0	0	0	0	0
20歳代	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0
30歳代	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
40歳代	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
50歳代	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
60歳以上	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0

表20 オムニバスQ3-SQ2. (6)覚せい剤(イ)1年以上前【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	49	33	5	5	5	1	0	2	3	0
男	24	11	3	3	5	0	0	2	3	0
20歳代	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0
30歳代	7	2	2	2	1	0	0	1	1	0
40歳代	7	4	1	1	1	0	0	1	0	0
50歳代	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
60歳以上	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0
女	25	22	2	2	0	1	0	0	0	0
20歳代	6	5	1	1	0	0	0	0	0	0
30歳代	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
40歳代	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
50歳代	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0
60歳以上	6	5	1	1	0	0	0	0	0	0

表21 オムニバスQ3-SQ2. (1)シンナー-(ア)1年未満【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	49	36	3	1	2	1	1	2	3	0
男	24	17	1	0	1	0	0	2	3	0
20歳代	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0
30歳代	7	5	0	0	0	0	0	1	1	0
40歳代	7	5	0	0	1	0	0	1	0	0
50歳代	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60歳以上	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0
女	25	19	2	1	1	1	1	0	0	0
20歳代	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0
30歳代	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
40歳代	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0
50歳代	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0
60歳以上	6	5	0	0	0	0	1	0	0	0

表22 オムニバスQ3-SQ2. (1)シンナー-(イ)1年以上前【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	49	17	7	4	5	2	9	2	3	0
男	24	8	5	1	1	1	3	2	3	0
20歳代	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0
30歳代	7	4	0	0	0	0	1	1	1	0
40歳代	7	2	2	0	1	0	1	1	0	0
50歳代	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
60歳以上	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0
女	25	9	2	3	4	1	6	0	0	0
20歳代	6	4	0	0	1	0	1	0	0	0
30歳代	5	1	0	2	2	0	0	0	0	0
40歳代	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0
50歳代	4	1	1	0	1	0	1	0	0	0
60歳以上	6	1	1	0	0	0	4	0	0	0

表23 オムニバスQ4. 薬物を乱用したいと思った経験【性・年代別】

	総数	最近1年未満にある	1年以上前にある	思ったことはない	答えたくない	わからない
総数	1419	3	18	1377	13	8
男	614	2	11	589	7	5
20歳代	76	1	3	69	1	2
30歳代	117	0	2	113	1	1
40歳代	78	0	3	73	2	0
50歳代	119	0	2	116	1	0
60歳以上	224	1	1	218	2	2
女	805	1	7	788	6	3
20歳代	112	1	2	108	0	1
30歳代	136	0	3	132	1	0
40歳代	128	0	1	125	2	0
50歳代	192	0	0	188	3	1
60歳以上	237	0	1	235	0	1

表24 オムニバスQ3で乱用者を知っているのと答えた方が知っている薬物ごとの乱用者数

	知っている1年未満に乱用した人数										知っている1年以上前に乱用した人数										
	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくなくわからない	不明	1人以上	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくなくわからない	不明	1人以上	
シンナー	49	36	3	1	2	1	1	2	3	0	8										
大麻	49	43	1	0	0	0	0	2	3	0	1										
MDMA	49	43	0	0	1	0	0	2	3	0	1										
コカイン	49	44	0	0	0	0	0	2	3	0	0										
向精神薬	49	43	1	0	0	0	0	2	3	0	1										
覚せい剤	49	43	0	1	0	0	0	2	3	0	1										
ヘロイン	49	44	0	0	0	0	0	2	3	0	0										
												知っている1年以上前に乱用した人数									
該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくなくわからない	不明	1人以上	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくなくわからない	不明	1人以上		
シンナー	49	17	7	4	5	2	9	2	3	0	27										
大麻	49	42	2	0	0	0	0	2	3	0	2										
MDMA	49	44	0	0	0	0	0	2	3	0	0										
コカイン	49	44	0	0	0	0	0	2	3	0	0										
向精神薬	49	42	2	0	0	0	0	2	3	0	2										
覚せい剤	49	33	5	5	1	0	0	2	3	0	11										
ヘロイン	49	43	0	1	0	0	0	2	3	0	1										

第4章 まとめ

表 25 にオムニバス調査、郵送調査ごとの「覚せい剤を乱用している人を知っている」と答えた人数の性年齢別集計結果を示している。

オムニバス調査の場合は、1,419 人中 12 名であり、割合の推定値は表 26 に書いているように約 0.8%(もう少し詳しく書くと 0.8456%である。図 1 の計算の場合は小数第 2 位までの 0.85%で計算している。)となる。

$$\boxed{\text{知っている人} = \text{乱用者数}}$$

という仮定を用いれば、我が国における 20 歳以上の人口は約 1 億人であることから、約 85 万人が覚せい剤乱用者ということができると思われる。昨年度の割合は 1.6%である。数値から見た場合には、1 年で約半分になっていることになる。この点については最後に考察する。

一方郵送の場合は、1,045 人中 48 人であり、割合の推定値は 4.6%、乱用者数は約 460 万人となり、非常に多い値となっている。昨年と同様に、郵送調査の割合の方がはるかに大きい。この原因としては昨年度の報告書でも述べたが、「オムニバスと比べて回答者にゆっくり思い出す時間があったために、遠い昔の記憶がよみがえる」ことが可能性として考えられる。表 27 に示すように、調査した 7 種類の薬物で、知っている乱用者が最も多い薬物は予想どおり「シンナー」であり、MDMA やヘロインは非常に少ない(注:表 27 では覚せい剤乱用を知っていると答えた者の人数 50 名を示しているが、表 25 と表 26 では、50 人の中で知っている者の人数を応えなかった 2 名を除いた 48 名を表に示している。)。この結果や他の回答結果から見ても回答者はまじめな態度で回答しているものと想像できることから、オムニバスと郵送との調査結果の隔たりについては、今後も調査を繰り返し、確認する必要がある。ただし、サンプル数をかなり増やさない限り正確な結論を得ることはできないと思う。

昨年からオムニバス調査において「1 年未満」の期間内に覚せい剤を乱用した者を知っているかについて調査を行っている。その結果は表 25 に示すように 1,419 人中 1 人が「知っている」と回答し、その割合の推定値は約 0.07%となるので、我が国の 20 歳以上人口である 1 億人を乗ずると約 7 万人が「1 年未満」の期間内に覚せい剤を乱用した者の数値となる。

また、本年は覚せい剤以外の薬物についても調査を行ったが、その結果は表 28 に示すとおりである。また、表 29 には、平成 13 年度の調査結果を示している。両調査の結果を比較してみると、覚せい剤の乱用者を知っている者の割合が大幅に減少していることがわかる。

	平成13年度		平成14年度	
	1年未満	1年以上前	1年未満	1年以上前
覚せい剤	9(0.66%)	13(0.95%)	1(0.07%)	11(0.76%)

上表は平成 13 年度調査と平成 14 年度調査の覚せい剤の乱用者を知っていると回答した者の数とその割合である。1 年以上前に乱用していた者を知っている回答者の割合は、平成 13 年度調査では 0.95%、平成 14 年度調査では 0.76%であり、サンプル数が 1400 程度であることを考えれば、その違いは調査誤差の範囲と考えられ、大幅な変化は見られない。しかしながら、覚せい剤の 1 年未満の乱用者を知っている者の数についてはそうではない。信頼区間を 95%とすると、覚せい剤の 1 年未満の乱用者を知っている者の割合は、平成 13 年度は 0.24%以上 1.08%以下、平成 14 年度は 0%以上 0.21%以下となる。信頼区間に重なりはなく、調査結果から見れば、1 年未満の覚せい剤乱用者数は減っていると結論できうる値となっている。ただし、サンプル数が少ないために、1 年未満の覚せい剤乱用者が本当に減少しているか否かを見極めるためには、本調査を、今後も継続して行う必要があると考える。

表28 乱用者を知っている人の割合(平成14年度オムニバス)

	過去		1年未満	
	割合	人数(万人)	割合	人数(万人)
シンナー	2.47	249	0.56	57
大麻	0.21	21	0.07	7
MDMA	0.07	7	0.07	7
コカイン	0	0	0	0
向精神薬	0.21	21	0.07	7
覚せい剤	0.85	85	0.07	7
ヘロイン	0.07	7	0	0

注:人数は、割合に20歳以上人口10094万人をかけて求めた。

表29 乱用者を知っている人の割合(平成13年度オムニバス)

	過去		1年未満	
	割合	人数(万人)	割合	人数(万人)
シンナー	2.78	278	0.66	66
大麻	0.88	88	0.29	29
MDMA	0.07	7	0	0
コカイン	0.07	7	0	0
向精神薬	0.22	22	0.07	7
覚せい剤	1.61	161	0.66	66
ヘロイン	0.07	7	0.07	7

注:人数は、割合に20歳以上人口10007万人をかけて求めた。

図1は、表26に示したオムニバス調査による「覚せい剤使用者を知っている人」の割合の調査年月日別の変化をグラフで示したものである。縦棒は推定誤差を表している。このグラフからおおざっぱに言えることは、2%程度の人が覚せい剤乱用者を知っているという状態が続いていた。図1から分かるように、12月のオムニバス調査における「覚せい剤使用者を知っている人」の割合は、平成12年では2.5%、平成13年では1.6%、平成14年では0.8%と減少している。すでに述べたように13年度調査から14年度調査への減少は1年未満の乱用者を知っていると答えた者が大幅に減少したためであるが、サンプル数が少ないために、推定誤差が0.5%程度あり、覚せい剤の乱用者が減少していると結論付けるのは、本調査を継続した上、その調査結果を検討しなければならないと考えている。

表25 オムニバス、郵送調査での知っている覚せい剤乱用者数の比較

	オムニバス				郵送			
	総数	1年未満	1年以上前	合計	総数	1年未満	1年以上前	合計
総数	1419	1	11	12	1045	3	45	48
男	614	0	8	8	488	1	25	26
20歳代	76	0	1	1	103	0	2	2
30歳代	117	0	3	3	87	0	7	7
40歳代	78	0	2	2	89	0	5	5
50歳代	119	0	1	1	90	1	7	8
60歳以上	224	0	1	1	119	0	4	4
女	805	1	3	4	557	2	20	22
20歳代	112	1	1	2	100	0	5	5
30歳代	136	0	0	0	95	1	6	7
40歳代	128	0	0	0	79	0	2	2
50歳代	192	0	1	1	99	1	2	3
60歳以上	237	0	1	1	184	0	5	5

(注) 郵送調査において、知っている乱用者数は表14付1-2&3.3の不明を除いている。

表26 覚せい剤乱用者を知っている者の割合の比較

調査月	総数	人数	下限	推定値	上限
2002年郵送	1045	48	3.3	4.6	5.9
2002年12月	1419	12	0.4	0.8	1.3
2001年郵送	1095	67	4.7	6.1	7.5
2001年12月	1367	22	0.9	1.6	2.3
2000年8月	1413	29	1.3	2.1	2.8
9月	1432	29	1.3	2.0	2.8
12月	1376	35	1.7	2.5	3.4
2000年合計	4221	93	1.8	2.2	2.6
1999年8月	1394	45	2.3	3.2	4.2
9月	1427	32	1.5	2.2	3.0
12月	1341	32	1.6	2.4	3.2
1999年合計	4162	109	2.1	2.6	3.1
1998年9月	1419	23	1.0	1.6	2.3
11月	1427	28	1.2	2.0	2.7
1998年合計	2846	51	1.3	1.8	2.3

表27 郵送調査においてシンナー、大麻等の薬物を乱用したことがある人を知っていると答えた者の数

	知っている過去に(時期を問わない)シンナー、大麻等を乱用した者の人数											
	該当者	1人	2人	3人	4人	5人	6~9人	10~19人	20人以上	不明		
シンナー	225	55	46	41	10	23	10	18	11	11		
大麻	59	26	6	5	6	3	3	6	1	3		
MDMA	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0		
コカイン	8	5	1	1	0	0	0	1	0	0		
向精神薬	13	7	2	3	0	1	0	0	0	0		
覚せい剤	50	21	12	6	3	3	2	1	0	2		
ヘロイン	8	3	0	3	0	0	0	0	0	2		
		知っている一年以内にシンナー、大麻等を乱用した者の人数										
	該当者	1人	2人	3人	4人	5人	6~9人	10~19人	20人以上	不明		
シンナー	225	10	1	0	0	1	0	1	0	50		
大麻	59	3	0	1	0	0	0	0	0	12		
MDMA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
コカイン	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
向精神薬	13	3	1	0	0	0	0	0	0	3		
覚せい剤	50	1	1	0	0	0	1	0	0	8		
ヘロイン	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4		

(注) 不明の人数は調査票の該当個所が空欄であったもの人数。過去の乱用者の場合は、記入がない場合は、詳細な回答を拒否したと考えられる。一年以内の乱用者の場合は、回答拒否の場合も考えられるが、ゼロと答えられていると考えることができる。

図1 覚せい剤乱用者を知っている人の割合の変化(縦棒の下の数字は割合から推定した乱用者数(単位:万人))

