

表 13-1 から 13-6 は調査票 A の Q4-SQ と調査票 B の Q2-SQ2 と調査票 01 の Q3-SQ2 の使用時期についての結果をまとめたものである。

Q 4 - S Q . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。
 使用した人の使用時期から、(1)ここ 1 年未満、(2)1 年以上に分けて教えてください。
 (1) 1 年未満 (2) 1 年以上

人 人 1 答えたくない
 2 わからない

Q 2 - S Q 2 . [回答票 2] では、使用薬物、使用時期ごとに薬物使用者の人数をお答えください。
 (1)シンナーなどの有機溶剤について、(ア) 1 年未満では何人ですか。(イ) 1 年以上前では何人ですか。
 【調査員注：(2)～(3)も同様に聞く】

	(ア) 1 年未満	(イ) 1 年以上前
(1)シンナーなどの有機溶剤	人.....	人
(2)大 麻	人.....	人
(3)覚せい剤	人.....	人

- ・表 13-1 調査票 A の Q4SQ Q4 で覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている
 使用者数：2003 年 8 月調査
- ・表 13-2 調査票 A の Q4SQ Q4 で覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている
 使用者数：2003 年 10 月調査
- ・表 13-3 調査票 B の Q2-SQ2(3) Q2 で薬物を使用している知人があると答えた者が知っている
 覚せい剤使用者数：2003 年 9 月調査
- ・表 13-4 調査票 B の Q2-SQ2(3) Q2 で薬物を使用している知人があると答えた者が知っている
 覚せい剤使用者数：2003 年 11 月調査
- ・表 13-5 調査票 B の Q2-SQ2(3) Q2 で薬物を使用している知人があると答えた者が知っている
 覚せい剤使用者数：2003 年 12 月調査
- ・表 13-6 覚せい剤を使用しているあるいは薬物を使用している知人があると答えた者が知っている
 覚せい剤使用者数 2003 年の 5 回の調査結果と 2001 年、2002 年の調査結果と比較

表 13-1 と 13-2 がそれぞれ、調査票 A を用いた 8 月調査、10 月調査の結果である。該当者は Q4 で、「覚せい剤使用者を知っている」と回答した者の数である。これに対し、表 13-3 から 13-5 はそれぞれ、調査票 B を用いた 9 月調査、11 月調査、12 月調査の結果であり、該当者は何らかの薬物使用者を知っている者の数である。延べ人数は、(知っている使用者数)と(回答者数)の積の和である。例えば、2003 年 8 月調査のここ 1 年未満の使用者については

$$1 \times 6 + 2 \times 1 + 3 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 0 = 8$$

で計算している。5 人以上と答えた場合は、すべて 5 人としているので、実際よりは小さい値を推定していることになる。今までの解析も今回の解析もこのような延べ数ではなく、単に「使用者を知っている」と答えた者の数を扱っている。このようにした場合は、2003 年 8 月における「1 年未満の使用者を知っている」

と答えた者の数は

$$6+1+0+0+0=7$$

となる。詳しくは第3章のまとめのところで述べているが、調査票 A の場合の方が、延べ人数、使用者を知っている人数とも調査票 B 及び調査票 01 の場合よりも多いことが表 13-6 から分かる。調査票 A を用いた 8 月調査、10 月調査における「覚せい剤使用者を知っている」と回答する者の比率が 1998 年から 2000 年の調査結果と大差がないことから、2002 年と 2003 年の 3 回の調査（9 月、11 月、12 月）の結果が、何らかの理由で小さめに出ているものとする。

表13-2 調査票AのQ4SQ Q4で覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数:2003年10月調査

SQ. あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。
 使用した人の使用時期から、(1)ここ1年未満、(2)1年以上に分けて教えてください。

2003年10月調査 使用時期1年未満

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	36	18	8	1	4	0	0	3	2	22
男性	15	9	3	1	1	0	0	1	0	8
20-29	7	3	2	1	1	0	0	0	0	7
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1
50-59	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0
60-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	21	9	5	0	3	0	0	2	2	14
20-29	7	3	2	0	1	0	0	0	1	5
30-39	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1
40-49	2	1	0	0	1	0	0	0	0	3
50-59	4	1	1	0	1	0	0	1	0	4
60-	4	1	1	0	0	0	0	1	1	1

2003年10月調査 使用時期1年以上前

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	36	10	9	2	6	0	4	3	2	51
男性	15	4	2	2	5	0	1	1	0	26
20-29	7	3	1	0	3	0	0	0	0	10
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2
50-59	4	0	1	0	1	0	1	1	0	9
60-	2	0	0	1	1	0	0	0	0	5
女性	21	6	7	0	1	0	3	2	2	25
20-29	7	1	3	0	0	0	2	0	1	13
30-39	4	1	2	0	0	0	1	0	0	7
40-49	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1
50-59	4	2	0	0	1	0	0	1	0	3
60-	4	1	1	0	0	0	0	1	1	1

表13-3 調査票BのQ2-SQ2(3) Q2で薬物を使用している知人があると答えた者が知っている覚せい剤使用者数:2003年9月調査

SQ2.〔回答票2〕では、使用薬物、使用時期ごとに薬物使用者の人数をお答えください。

(ア)1年未満では何人ですか。(イ)1年以上前では何人ですか。

2003年9月調査 使用時期1年未満

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	34	25	1	1	1	0	0	1	3	2	6
男性	18	13	1	1	0	0	0	1	2	0	3
20-29	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2
40-49	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50-59	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1
60-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	16	12	0	0	1	0	0	0	1	2	3
20-29	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3
30-39	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
50-59	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60-	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0

2003年9月調査 使用時期1年以上前

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	34	20	2	2	2	0	2	1	3	2	22
男性	18	12	1	1	0	0	1	1	2	0	8
20-29	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	5	3	1	0	0	0	1	0	0	0	6
40-49	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50-59	4	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2
60-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	16	8	1	1	2	0	1	0	1	2	14
20-29	6	3	0	0	2	0	1	0	0	0	11
30-39	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
40-49	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
50-59	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
60-	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0

表13-4 調査票BのQ2-SQ2(3) Q2で薬物を使用している知人があると答えた者が知っている覚せい剤使用者数:2003年11月調査

SQ2.〔回答票2〕では、使用薬物、使用時期ごとに薬物使用者の人数をお答えください。

(ア)1年未満では何人ですか。(イ)1年以上前では何人ですか。

2003年11月調査 使用時期1年未満

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	45	37	2	0	0	0	0	1	4	1	2
男性	24	18	2	0	0	0	0	1	2	1	2
20-29	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30-39	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40-49	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
50-59	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
60-	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1
女性	21	19	0	0	0	0	0	0	2	0	0
20-29	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30-39	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
60-	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2003年11月調査 使用時期1年以上前

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	45	33	4	2	0	0	0	1	4	1	8
男性	24	17	2	1	0	0	0	1	2	1	4
20-29	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	3
30-39	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1
40-49	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
50-59	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
60-	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	21	16	2	1	0	0	0	0	2	0	4
20-29	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1
30-39	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40-49	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
60-	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2

表13-5 調査票BのQ2-SQ2(3) Q2で薬物を使用している知人があると答えた者が知っている覚せい剤使用者数:2003年12月調査

SQ2〔回答票2〕では、使用薬物、使用時期ごとに薬物使用者の人数をお答えください。

(ア)1年未満では何人ですか。(イ)1年以上前では何人ですか。

2003年12月調査 使用時期1年未満

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	27	23	0	0	0	0	1	1	1	1	5
男性	16	14	0	0	0	0	1	1	0	0	5
20-29	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
60-	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	11	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20-29	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40-49	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60-	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2003年12月調査 使用時期1年以上前

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
総数	27	16	5	3	0	0	0	1	1	1	11
男性	16	10	4	1	0	0	0	1	0	0	6
20-29	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
30-39	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
50-59	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60-	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3
女性	11	6	1	2	0	0	0	0	1	1	5
20-29	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
30-39	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40-49	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60-	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3

表13-6 覚せい剤を利用しているあるいは薬物を使用している知人があると答えた者が知っている覚せい剤使用者数
2003年の5回の調査結果と2001年、2002年の調査結果と比較

使用時期1年未満

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
2001年12月	72	50	5	2	2	0	0	4	5	4	15
2002年12月	49	43	0	1	0	0	0	0	2	3	2
2003年 8月	33	21	6	1	0	0	0		3	2	8
2003年 9月	34	25	1	1	1	0	0	1	3	2	6
2003年10月	36	18	8	1	4	0	0		3	2	22
2003年11月	45	37	2	0	0	0	0	1	4	1	2
2003年12月	27	23	0	0	0	0	1	1	1	1	5

使用時期1年以上前

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	不明	答えたくない	わからない	延べ人数
2001年12月	72	46	5	5	2	0	1	4	5	4	26
2002年12月	49	33	5	5	1	0	0	0	2	3	18
2003年 8月	33	5	7	9	3	1	3		3	2	53
2003年 9月	34	20	2	2	2	0	2	1	3	2	22
2003年10月	36	10	9	2	6	0	4		3	2	51
2003年11月	45	33	4	2	0	0	0	1	4	1	8
2003年12月	27	16	5	3	0	0	0	1	1	1	11

(注) 2003年8月、10月調査における該当者は覚せい剤使用者を知っていると回答した人数。その他は、薬物使用者(2001年、2002年は7種
2003年9月、11月、12月は3種)を知っていると回答した人数。